

BAHAGIAN DISERANG

NAMA BIASA (BAHASA MALAYSIA)

Ferrisia

NAMA BIASA (BAHASA INGGERIS)

NAMA SAINTIFIK *Ferrisia virgata*

ORDER Homoptera

FAMILI Pseudococcidae

CIRI-CIRI

- Menyerang putik koko dan juga pucuk
- Turut menyerang tanaman lain seperti getah, sayuran, pokok bunga raya, tomato, Gliricidia, kopi c
- Koya koko terbesar dengan betina dewasa sebelum bertelur sepanjang 4-5mm
- Betina dewasa mempunyai badan yang lembut dan berbentuk bujur memanjang
- Bahagian lateral dan terminal mempunyai filamen diselaputi lilin putih
- Filamen kaudal (bahagian posterior badan) berlilin dan mempunyai saiz sekurangnya setengah da
- Hanya sepasang dilamen kaudal berbanding spesies lain
- Mengeluarkan madu dan *Crematogaster, Siphonotus, Pseudococcus* beristik dengan semua *Psepele*
-

BIOLOGI

- Kitar hidup dengan metamorfosis tidak lengkap iaitu telur, nimfa dan dewasa

SIMPTOM DAN KEROSAKAN

- Tumpukan koya ini sering tertumpu pada tangkai putik dan sering berjujukan sepanjang lurah buah
- Dijumpai di bahagian terlindung dari cahaya matahari
- Jarang mendatangkan kerosakan kepada buah dan dianggap perosak minor untuk koko

KAWALAN

- Tiada kawalan disyorkan berikutan serangan tidak serius
- Jika serius, boleh menggunakan semburan racun serangga dari kumpulan Pyrethroid



GAMBAR SERANGGA



GAMBAR SIMPTOM KEROSAKAN