

Trips Selenothrips

BAHAGIAN DISERANG	Daun
NAMA BIASA (BAHASA MALAYSIA)	Trips
NAMA BIASA (BAHASA INGGERIS)	Red-banded thrips
NAMA SAINTIFIK	<i>Selenothrips rubrocinctus</i>
ORDER	Thysanoptera
FAMILI	Thripidae

CIRI-CIRI

- Telur boleh didapati pada bahagian bawah daun, terutama berhampiran vena atau pada buah koko matang
- Nimfa mengeluarkan cecair dari bahagian posterior
- Larva, prepupa dan pupa mempunyai ciri unik dengan garisan merah terang dibahagian ketiga dan keempat abdomen
- Dewasa berwarna hitam dan turut mempunyai lingkaran merah

BIOLOGI

- Metamorfosis lengkap
- Telur dikeluarkan secara tunggal
- Peringkat larva yang gregarious dan sering kelihatan bersama dewasa

SIMPTOM DAN KEROSAKAN

- Cecair yang dikeluarkan dibahagian posterior nimfa akan menyebabkan tompokan coklat, menjadikan daun mulai mengering dan mati
- Kebiasaannya menyerang dibawah permukaan daun dengan populasi yang tinggi
- Perosak minor koko dan jarang ditemui

KAWALAN

- Melakukan semburan racun serangga dengan bahan aktif Chlorpyrifos setiap 2 atau tiga minggu dengan sasaran kepada



pucuk koko



Gambar Seranga



Gambar Simptom Kerosakan



