

Pengorek Batang Indarbella

BAHAGIAN DISERANG	Batang
NAMA BIASA (BAHASA MALAYSIA)	Pengorek Batang
NAMA BIASA (BAHASA INGGERIS)	Cocoa cushion and bark borer
NAMA SAINTIFIK	<i>Squamura disciplaga</i> , <i>Indarbela disciplaga</i>
ORDER	Lepidoptera
FAMILI	Metarbelidae

CIRI-CIRI

- Turut menyerang tanaman lain seperti Acacia, ficus dan durian
- Terdapat galeri terowong frass pada permukaan luar kulit terutama dibahagian kusyen dan batang koko
- Lubang masuk larva kebiasaannya juga merupakan lubang keluar kemudiannya
- Kebiasaannya aktif diwaktu malam

BIOLOGI

- Sebanyak 15-25 biji telur pada satu longgokan
- Larva yang mengambil masa sekitar 3-4 bulan bagi melengkapkan kitar hidup
- Dewasa mempunyai jangka hayat pendek namun mampu bertelur sehingga 2000 biji

SIMPTOM DAN KEROSAKAN

- Larva memakan bahagian batang dibawah terowong sutera yang ditutupi pellet frass
- Larva permulaannya berada dibawah terowong dan apabila semakin matang mula melombong ke dalam batang dan rekahan dahan pokok
- Boleh mendatangkan kesan serius melibatkan pengurangan hasil



terutama jika menyerang dahan yang menghasilkan koko

- Simptom serangan seakan *Zeuzera* namun galeri frass lebih kecil, teratur dan kemas
- Serangan kebiasaannya kurang serius jika dibandingkan serangan *Zuezera*

KAWALAN

- Membuang galeri frass di luar batang dan mencari lubang masuk serangga
- Suntikan racun serangga pada lubang tersebut, dan seterusnya menutup dengan tanah bagi menutup ruang udara didalam batang



Gambar Seranga





Gambar Simptom Kerosakan

