

Kumbang Kaboi Coklat

BAHAGIAN DISERANG	Daun
NAMA BIASA (BAHASA MALAYSIA)	Kumbang Kaboi Hitam
NAMA BIASA (BAHASA INGGERIS)	Black Cockchafer Beetle
NAMA SAINTIFIK	<i>Adoretus spp.</i> , <i>Lepadoretus spp.</i> Dan <i>Chaetadoretus</i>
ORDER	Coleoptera
FAMILI	Scarabaeidae

CIRI-CIRI

- Turut menyerang tumbuhan lain seperti rambutan, kopi dan kelapa sawit
- Kumbang kaboi coklat menyerang di waktu malam dalam bilangan yang banyak dan boleh menyebabkan kerosakan yang teruk terutamanya bagi pokok kecil
- Aktif di waktu malam dan bersembunyi pada waktu siang di bawah lapisan daun kering atau di dalam tanah di pangkal pokok yang diserang
- Badan dewasa berwarna coklat dengan bulu-bulu halus berwarna putih dan pendek

BIOLOGI

- Kitar hidup berbeza-beza bergantung kepada spesies
- DEWASA: Bersaiz 9mm - 11mm bergantung kepada spesies

SIMPTOM DAN KEROSAKAN

- Merosakkan pucuk dan daun muda, namun tidak memakan urat daun, menyebabkan daun diserang seakan-akan membentuk jala yang berlubang-lubang
- Porsi pemakanan yang lebih kecil jika dibandingkan dengan kumbang kaboi hitam

- Najis kumbang berwarna hitam boleh ditemui di permukaan daun muda

KAWALAN

- Anak pokok yang baru dipindahkan ke kebun perlu dilindungi samada menggunakan pelepah kelapa, plastik ataupun guni bagi mengelakkan gigitan kumbang kaboi ini
- Melakukan semburan racun dengan bahan aktif Chlorpyrifos serta Cypermethrin pada bahagian daun, dan taburan racun Carbofuran pada permukaan tanah



Gambar Seranga



Gambar Simptom Kerosakan