

Belalang Kunyit Valanga

BAHAGIAN DISERANG	Daun
NAMA BIASA (BAHASA MALAYSIA)	Belalang Kunyit
NAMA BIASA (BAHASA INGGERIS)	Valanga Grasshopper, Shorthorned grasshoppers, Malaysian locust
NAMA SAINTIFIK	<i>Valanga nigricornis (Burm.)</i>
ORDER	Orthoptera
FAMILI	Acrididae

CIRI-CIRI

- Saiz besar dan dewasa boleh mencecah 7cm
- Nimfa berwarna kehijauan
- Apabila meningkat dewasa, bertukar menjadi warna kuning yang jelas dengan bintik kehitaman pada bahagian kepala dan kaki
- Kaki berbintik-bintik kuning dan pantas bergerak jika mengesan gangguan
- Bertelur antara 5-8cm didalam tanah

BIOLOGI

- Nimfa mempunyai 6 instar dan berusia kira-kira 4 bulan
- Dewasa mampu bertelur diantara 70 hingga 100 biji

SIMPTOM DAN KEROSAKAN

- Bahagian tepi mempunyai kesan gigitan termasuk tulang daun.
- Luas kerosakan adalah besar dan kadangkala hanya meninggalkan tangkai daun
- Kerosakan yang lebih besar berbanding kerosakan disebabkan kumbang kaboi
- Kerosakan serius mungkin berlaku sekiranya serangan di dalam nurseri

KAWALAN

- Melakukan semburan racun serangga dengan bahan aktif Chlorpyrifos setiap 2 atau tiga minggu dengan sasaran kepada pucuk koko



Gambar Seranga



Gambar Simptom Kerosakan

