

Ulat Bungkus Mahasena

BAHAGIAN DISERANG	Daun
NAMA BIASA (BAHASA MALAYSIA)	Ulat Bungkus
NAMA BIASA (BAHASA INGGERIS)	Bagworm
NAMA SAINTIFIK	<i>Mahasena corbetti</i>
ORDER	Lepidoptera
FAMILI	Psychidae

CIRI-CIRI

- Serangga polifagus dan menyerang tanaman lain seperti kelapa, kelapa sawit, kopi dan pokok sitrus
- Serangga betina berada didalam kelongsong yang berbentuk tidak sekataa
- Hanya serangga dewasa sahaja mampu terbang

BIOLOGI

- TELUR : 16 hari
- LARVA : 11 instar untuk jantan dan 12 instar untuk betina antara 75 - 82 hari
- PUPA : 26 hari

SIMPTOM DAN KEROSAKAN

- Populasi boleh meningkat dengan mendadak menyerang daun dengan menggigit bahagian daun kecuali tulang daun
- Jarang dilaporkan mendatangkan kerosakan serius jika dibandingkan dengan serangan keatas daun kelapa sawit

KAWALAN

- Mengutip kelongsong dengan tangan dan membuangnya
- Jika serangan serius berlaku, menggunakan racun serangga Trichlorfon dan Acephate



Gambar Seranga



Gambar Simptom Kerosakan