

Kumbang Kaboi Hitam Apogonia

BAHAGIAN DISERANG	Daun
NAMA BIASA (BAHASA MALAYSIA)	Kumbang Kaboi Hitam
NAMA BIASA (BAHASA INGGERIS)	Black Cockchafers Beetle
NAMA SAINTIFIK	<i>Apogonia spp.</i>
ORDER	Coleoptera
FAMILI	Scarabaeidae

CIRI-CIRI

- Turut menyerang tumbuhan lain seperti ciku, rambutan, kopi dan kelapa sawit
- Kumbang kaboi hitam menyerang di waktu malam dalam bilangan yang banyak dan boleh menyebabkan kerosakan yang teruk terutamanya bagi pokok kecil
- Aktif di waktu malam dan bersembunyi pada waktu siang di bawah lapisan daun kering atau di dalam tanah di pangkal poko yang diserang
- Keseluruhan badan mempunyai bintik lubang kecil

BIOLOGI

- Hanya peringkat dewasa yang menyerang daun. Peringkat telur dan larva tidak di jumpai pada daun
- TELUR: Sebiji-sebiji didalam tanah
- LARVA: Dalam tanah dan memakan bahan organik selama 67-77 hari
- DEWASA: Boleh hidup sehingga 4 bulan di dalam makmal

SIMPTOM DAN KEROSAKAN

- Merosakkan pucuk dan daun muda dari bahagian luar ke bahagian dalam termasuklah pada urat daun
- Najis kumbang berwarna hitam boleh ditemui di permukaan daun muda
- Kerosakan disebabkan spesies kaboi yang paling besar jika



dibandingkan dengan kaboi lain

KAWALAN

- Anak pokok yang baru dipindahkan ke kebun perlu dilindungi samada menggunakan pelepah kelapa, plastik ataupun guni bagi mengelakkan gigitan kumbang kaboi ini
- Melakukan semburan racun dengan bahan aktif Chlorpyrifos serta Cypermethrin pada bahagian daun, dan taburan racun Carbofuran pada permukaan tanah



Gambar Seranga





Gambar Simptom Kerosakan

