

Koya Cataecoccus

BAHAGIAN DISERANG	Buah
NAMA BIASA (BAHASA MALAYSIA)	Koya Koko
NAMA BIASA (BAHASA INGGERIS)	Mealy bug
NAMA SAINTIFIK	<i>Cataenococcus hispidus</i>
ORDER	Homoptera
FAMILI	Pseudococcidae

CIRI-CIRI

- Turut menyerang durian, rambutan, jambu batu dan buahan lain
- Tidak dianggap perosak pada buah koko, namun perosak minor kepada pucuk koko
- Mempunyai assosiasi mutualistik dengan semut hitam koko, dan memberi kebaikan sebagai agen kawalan biologi bagi Ulat Pengorek Buah Koko
- Betina diselaputi lapisan nipis berlilin dan mempunyai 3 peringkat instar, manakala jantan mempunyai 2 instar sahaja
- Mengeluarkan madu pada bahagian hujung posterior
- Tompokan koya rapat-rapat dan bertindih antara satu sama lain
- Sering berada pada buah koko yang terlindung dari cahaya matahari

BIOLOGI

- Metamorfosis tidak lengkap

SIMPTOM DAN KEROSAKAN

- Jarang mendatangkan kesan serius kepada buah koko
- Serangan pada bahagian pucuk menyebabkan pucuk berpintal dan mengganggu pertumbuhan, namun tidak menyebabkan kematian pucuk terbabit

KAWALAN

- Menggunakan semburan racun serangga dari kumpulan

Pyrethroid jika serangan adalah serius



Gambar Seranga



Gambar Simptom Kerosakan

